

オイスカ“親子で無農薬野菜をつくろう2010”


～5月のしおり～

5/22	5/29	6/5	6/12	6/19	6/26(次回)
雑草取り、活性液散布、虫取り					
← ラディッシュ収穫 →			← コマツナ収穫 →		

植え方 (トウモロコシ、枝豆、ナス、ピーマン)

キャベツ、ブロッコリーと植え方は基本同じ。

- ①印にしたがって苗がちょうど入るくらいの穴を掘り水をたっぷり入れる。
- ②苗を穴に入れて土を寄せる。
- ③隙間がないように苗の周りを軽く押さえ、周りにくぼみをつける。



管理作業

- ①雑草とり
苗の育成に邪魔にならない程度に。
雑草が多いと苗の日当たりが悪くなったり、風通しが悪く病気になったりします。
抜きすぎると手間が増えたり、土が雨で流れてしまったりします。
- ②肥料と活性液
肥料はやりすぎてもよくない。やりすぎると周りの雑草と比較し葉の色が濃い。トマトは葉が巻く。
実物は実が成りだしてから2週間毎にボカシをヒトツマミ与える。
活性液は1回/週～月の割合で約500倍に薄めて散布する。
- ③誘引
苗が倒れないように支柱に苗を結ぶ。きつく結ぶのは苗をいためるので、余裕をもって結ぶこと。
- ④間引き
苗の間にある程度間隔があいていないと野菜は大きくなることできない。野菜の大きさに間隔が決まる。
コマツナ、人参は段階的に間隔をあけて最終的には5cm間隔に。
ラディッシュは3cm間隔に。
- ⑤トマトの脇芽とり
脇芽はすべてとる。脇芽をとらないと苗が弱る。枝、葉が多くなり風通しが悪いと病気になりやすい。
- ⑥虫取り
悪い虫は駆除しよう(少量の苗であれば、手で取るのが確実)
アブラムシ：苗の液を吸って弱らせてしまう。⇒薄めた牛乳、酢等が有効の場合あり。
イモムシ、青虫、夜盗虫：葉を食べる。夜盗虫は昼間は地中にいるため、厄介。⇒薄めたストチューが有効
芯食い虫：ダイコンやキャベツ等のアブラナ科 **アワノメイガ**：トウモロコシの茎、実をたべる。
の芯を食べてしまう。苗が小さい時は要注意。



良い虫

てんとう虫：アブラムシを食べる クモ：悪い虫を食べてくれる

次回6月26日の連絡事項

▽集合 (雨天決行)
9:45

▽もちもの (通常のもちもの以外)
収穫袋
▽イベント 丸太切り

▽農作業
収穫 (コマツナ、ジャガイモ、人参、ミニトマト)
管理作業 (雑草取り、芽かき、誘引等)